

ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

30^e Mémoire (1)

XLVII

Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Attidae

PAR EUGÈNE SIMON.

Lyssomanes quadrinotatus sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Albido-testaceus, laevis, parte cephalica utrinque maculis ocularibus nigris binis (antica subtriquetra, altera minore subrotunda), abdomine angusto et longo, supra utrinque maculis fuscis binis (antica subrotunda, altera longa) notato, pedum tarsi, praesertim anticis, infuscatis et olivaceis, oculis pilis albo-nitidis paucis cinctis, clypeo ad marginem anguste coccineo-piloso. Chelae medioeres, haud porrectae sed divaricatae, extus ad apicem setis spiniformibus inordinatis paucis armatae, margine inferiore sulci dentibus trinis, inter se aequis et aequidistantibus, instructo. Pedes simpliciter et parce pilosi, haud fasciculati, metatarsis anticis curvatis. Pedes-maxillares medioeres, tibia mutica patella paulo longiore et graciliore curvata, tarso angusto, processu apicali cylindraceo, bulbo circiter aequilongo.

Venezuela : Colonia Tovar!

Pandisus (2) **scalaris** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax obscure fulvus, fusco-marginatus, regione oculorum utrinque late nigro marginata, pilis albido-viridi-micantibus laete vestita. Clypeus oculis anticis saltem duplo angustior, micanti-pilosus. Abdomen angustum, luteum, supra vitta lata, maculas binas testaceas includente, subtus utrinque macula fusca longa notatum, supra pilis albo-micantibus, in lateribus, saltem postice, pilis coccineis, laete vestitum. Chelae, partes oris, sternum coxaeque lutea. Pedes obscure fulvi, femoribus anticis subtus late infuscatis et vittatis, aculeis nigris longis et numerosis armati. Pedes-maxillares fulvi, femore subtus ad apicem nigro et minute

(1) Voir pour les mémoires 1 à 29, n^{os} I à XLVI, *Annales* de 1873 à 1897.

(2) **Pandisus** nov. gen. — Ab *Asamonea* differt area oculorum dorsalium, superne visa, vix 1/3 latiore quam longiore, oculis anticis et posticis maximis, intermediis minutissimis, cephalothorace alto, mamillis superioribus articulo-apicali brevi munitis. — Typus *P. scalaris* E. Sim.

mucronato, patella brevi, nodosa, subtus, ad marginem inferiorem apophysi nigra lamellosa, ad basin ampliata, ad apicem acuta et uncatata armata, tibia patella paulo longiore, extus ad basin, fere supra, apophysi parva et obtusa, ad marginem inferiorem apophysi majore lamellosa nigra et antice subacuta instructa.

Madagascar : Tamatave (Camboué).

Epicharmus ⁽¹⁾ **Ernsti** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax humilis, longus, postice leviter ampliatus, fusco-testaceus, opacus, parte cephalica utrinque maculis ocularibus nigris notata et pilis flavidis ornata. Abdomen angustum, teretiusculum, obscure fulvum, supra fusco-bilineatum, mamillae fuscae. Sternum fusco-testaceum opacum, subtilissime coriaceum. Chelae breves, verticales et parallelae, margine inferiore sulci dentibus minutissimis seriatis (5-6) armato. Pedes longissimi et gracillimi, lutei, femoribus quatuor anticis subtus ad basin fusco-vittatis. Pedes-maxillares fusco-testacei, tibia patella paulo brevior, extus ad apicem apophysi valida, recta et obtusa armata, tarso angusto attenuato, subacuminato et recto.

Venezuela : Caracas!

Orthrus ⁽²⁾ **bicolor** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax laevis, fusco-rufescens, parce et tenuiter flavido-pubescens, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigro-marginata, thoracica macula media dilutiore notata. Pili oculorum utrinque et subtus albidoflavidi, supra et in medio aurantiaci. Clypeus angustus, nudus. Abdomen angustum et longum, albidum, supra flavo-tinctum. Mamillae albae. Chelae longissimae, porrectae et attenuatae, extus deplanatae et tenuiter carinatae, nigro-aeenae, nitentes, margine superiore sulci dente submedio longo et acuto, inferiore, prope medium dentibus binis subaequis, 1^o curvato, atque ad basin dentibus minoribus 2 vel 3, armato, ungue longissimo et sinuoso. Partes oris fuscae. Sternum pedesque lutea, patellis cunctis parvis et muticis, tibiis anticis aculeis inferioribus tenuibus et longis et utrinque aculeis minoribus binis armatis, metatarsis tibiis multo brevioribus, subtus aculeis longioribus

(1) **Epicharmus** nov. gen. — A *Lyssomani* differt cephalothorace humili et longo, area oculorum dorsalium multo latiore quam longiore, parte labiali haud longiore quam latiore, metatarsis pedum parcissime aculeatis, plerumque aculeo parvo basali tantum munitis. — Typus *E. gracilis* Taczan.

(2) **Orthrus** nov. gen. — Ab *Asamonea* differt oculis intermediis minutissimis pone oculos dorsales anticis (haud intus) sitis et cum oculis posticis aream parallelam formantibus. — Typus *O. bicolor* E. Sim.

3-3 munitis. Pedes postici parvissime et minutissime aculeati. Pedes-maxillares sat longi; femore valde curvato, pilis crassis nigris, cristam longam designantibus ornato, patella tibiaque et supra et subtus crista nigra brevior ornatis; tibia patella paulo longiore, extus ad apicem apophysi brevi, infra oblique directa, armata; tarso angusto, tibia vix longiore; bulbo ovato simplici.

♀ Long. 5 mill. — Omnino albo-testacea, parte cephalica utrinque late nigra. Chelae verticales, margine inferiore sulci dentibus aequis et subcontiguis 6 vel 7 armato.

Ins. Philippinae : Antipolo!

Onomastus ⁽¹⁾ **nigricanda** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica testacea, pilis simplicibus pallide-flavidis crebre vestita et utrinque maculis ocularibus nigris binis notata. Pili oculorum flavidi. Pili clypei albo-argentei, fimbriam designantes. Abdomen albidum, mamillis nigris. Chelae, partes oris, sternum pedesque pallide lutea. Pedes-maxillares fulvi, supra olivacei, tarso infuscato; patella sat brevi valde convexa, extus, ad marginem inferiorem, apophysi fusca, valida et obtusa armata; tibia mutica patella brevior et angustior; tarso magno, acuminato.

Ins. Taprobane : Galle!

O. quinquenotatus sp. nov. — ♀ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica albidior, flavido-pilosa et utrinque maculis ocularibus nigris binis notata. Pili oculorum flavidi. Pili clypei longi, albido-argentei, fimbriam designantes. Abdomen ovatum, albidum, superne maculis nigris parvis quinque (quatuor anticis rectangulum designantibus, apicali paulo majore media), mamillis luteis. Chelae, partes oris, sternum pedesque albida, tibiis cunctis utrinque ad apicem nigro-notatis, subannulatis, femoribus patellisque anticis intus ad apicem minute nigro-punctatis.

Ins. Taprobane : Kandy ! Colombo !

O. patellaris sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica pilis simplicibus albis crasse vestita et utrinque maculis ocularibus nigris binis (antica subtriquetra, altera minore subrotunda) notata. Pili oculorum et clypei pauci, albidi. Abdomen ma-

(1) **Onomastus** nov. gen. — Ab *Orthro* differt oculis intermediis minutissimis (pone oculos dorsales anticos sitis) cum oculis posticis aream antice quam postice latioribus occupantibus. — Typus *O. nigricanda* E. Sim.

millaeque albida, concoloria. Chelae, partes oris, sternum pedesque pallide lutea. Pedes aculeis gracilibus longis et numerosis armati. Pedes-maxillares robusti; patella maxima, apicem versus ampliata et extus apophysii apicali nigra, depressa et obtusa armata; tibia mutica, patella angustiore et duplo brevior; tarso longe ovato, ciliato; bulbo valde complicato, ad marginem anteriorem apophysii longa, gracili et apice uncatata instructo.

India merid. : M^{les} Kodeikanel.

Nealces ⁽¹⁾ **striatipes** sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, utrinque et prope oculos niger, pilis pronis sat brevibus et obtusis obscure fulvis vestitus. Oculi antici pilis fulvis longis paucis cincti. Abdomen angustum et longum, supra nigricans et obscure fulvo-pubescent, ad marginem anticum setis albis paucis ornatum, subtus paulo dilutius et albido-pilosum. Chelae, partes oris sternumque nigricantia. Pedes longi et graciles, obscure fulvo-olivacei, coxis femoribusque dilutioribus sed femoribus utrinque nigricanti-lineatis, anticis nigro-punctatis, tibiis anticis apicem versus nigricanti-punctatis, metatarsis valde infuscatis, tibiis posticis utrinque nigricanti-lineatis. Pedes-maxillares robusti, fusci, patella mutica, longiore quam latiore; tibia multo brevior, crassior, supra ad apicem dilatata et compressa, extus excavata et apophysii lamellosa armata; tarso magno, late ovato sed acuminato et bulbum superante; bulbo simplici, ovato et convexo.

Java merid. : Palabuan (Fruhstorfer).

N. caligatus sp. nov. — ♀ Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica utrinque nigra, in medio aeneo-tincta, pilis brevibus pronis et obtusis, obscure fulvis vestitus. Oculi antici pilis longis, superne et extus fulvis, intus albidis, cincti. Abdomen longe ovatum, fulvum, supra parce fusco-punctatum sed postice punctis majoribus paucis subtriquetris notatum, subtus vitta lata nigricanti ornatum, fulvo-pubescent et supra maculis inordinatis albido-pilosis notatum, mamillis inferioribus nigris, superioribus testaceis, articulo basali extus nigro-vittato. Chelae nigricantes, laeves. Sternum fulvum, postice infuscatum. Pedes lutei, metatarsis anticis apice late infuscatis, tibiis posticis apice anguste fusco-annulatis, metatarsis latius biannu-

(1) **Nealces** nov. gen. — A *Bretto* differt oculis anticis apicibus in lineam subrectam, pedibus anticis gracilibus, haud fimbriatis, metatarsis tibiis brevioribus. — Typus *N. striatipes* E. Sim.

latis, tarsis prope apicem anguste annulatis. Pedum-maxillarium femur patellaque fulva, tibia tarsusque nigri, hic apice fulvus. Area vulvae nigra, plana, magna, semicircularis, septo medio striato divisa.

Ins. Taprobane : Galle!

Brettus Martini sp. nov. — ♀ Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, subniger, regione oculorum utrinque late nigra, cinereo-rufulo-pubescentis. Abdomen oblongum, atrum, supra antice sensim dilutius, cinereo-rufulo-pubescentis, subtus parcius albidopilosum. Sternum nigrum. Pedes nigri, rufulo-pubescentes, tarsis cunctis metatarsisque sex posterioribus luteis, metatarsis 4ⁱ paris nigro-biannulatis, femoribus 4ⁱ paris subtus ad apicem, tibiis 4ⁱ paris a basi ad apicem longe et crasse nigro-fimbriatis. Plaga genitalis fovea media ovata, longiore quam latiore, carinula tenui divisa, impressa. Pedes-maxillares albi, niveo-pilosi.

Natal, Zululand (D^r C. Martin).

B. albolimbatus sp. nov. — ♀ Long. 4,5 mill. — Cephalothorax niger, antice in medio cinereo-micanti-pubescentis, dein subglaber sed vitta latissima niveo-pilosa cinctus. Pili oculorum et clypei cinerei. Abdomen breviter ovatum, subrotundum, nigrum, micanti-pubescentis (viridi roseoque tinctum), maculis mediis parvis albis, vittaque marginali lata, antice alba postice flavido-tincta et leviter retro-arcuata ornatum, subtus albo-pubescentis sed vitta nigra, linea media alba exili secta, notatum. Chelae fusco-rufescentes, crebre fulvo alboque hirsutae. Sternum, coxae, femoraque nigra vel subnigra, albo-pilosa, tibiae quatuor anticae tibiaeque 4ⁱ paris fusco-castaneae, anticae subtus crasse nigro-fimbriatae, patellae tibiaeque 3ⁱ paris, metatarsi tarsiisque cuncti lutei, apice fusco-annulati. Pedes-maxillares graciles, albi, niveo-pilosi.

India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat).

B. semifimbriatus sp. nov. — ♀ Long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, vitta lata albo-pilosa cinctus, parte cephalica utrinque late nigro-plagiata. Pili oculorum breves, supra, oculos fulvo-rufuli, subtus albi. Clypeus parce albo-pilosus. Abdomen sat late ovatum, fusco-testaceum, supra parce nigricanti, punctatum et albidopilosum, subtus vitta lata, nigra, linea media albo-pilosa secta, notatum. Chelae sternumque fusco-rufula, parce albo-pilosa. Pedes quatuor antici fusco-rufuli, metatarsis tarsiisque luteis, tibiis subtus crasse nigro-fimbriatis. Pedes postici pallide ravidis, metatarsis tarsiisque luteis, cuncti numerose aculeati. Pedes-maxillares pallide lutei, albo-pilosi.

Plaga vulvae magna, subrotunda, rufula et pilosa, leviter depressa et carinula nigro-nitida parallela secta.

India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat).

B. Adonis sp. nov. — ♀ Long. 4 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens flavido-pubescentis, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigra, praesertim antice coccineo-pilosa. Pili oculorum breves, albidi, pili clypei in medio rufuli, utrinque in genis nivei. Abdomen teretiunculium, pallide testaceum, flavido-pubescentis, antice macula magna triquetra, in medio vitta transversa utrinque interrupta pallide fuscis maculaque apicali majore nigra, cunctis pilis pronis splendide violaceomicantibus vestitis supra ornatum, subtus vitta fusca integra notatum. Chelae, partes oris sternumque fulvo-rufescentia. Pedes lutei, femoribus tibiisque 1ⁱ paris fusco-castaneis, femoribus 2ⁱ paris subtus fusco-vittatis. Pedes-maxillares albidi, longe et crebre albo-hirsuti. Plaga genitalis magna, ovata, longior quam latior, fulva, antice foveolata.

Ins. Taprobane : Galle!

Cocalodes papuanus sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigra et maculis mediis binis obscurioribus confusis notata, pilis longis simplicibus albis vestitus et vittis binis, oculos includentibus et postice convergentibus, rubro-pilosis, ornatus. Pili oculorum inter oculos et intus albi, extus rubri. Clypeus oculis anticis plus duplo angustior, niger, breviter et parce albo-pilosus. Abdomen angustum et longum (fere omnino depile), atrum, vitta dorsali dilutiore notatum. Chelae cephalothorace paulo breviores, porrectae, fusco-rufulae, nitidae, leviter micanti-tinctae. Partes oris, sternum pedesque fulva, femoribus anticis subtus late nigro-cyaneo-vittatis, femoribus patellisque 4ⁱ paris late nigricanti-plagiatis et subannulatis, aculeis longis ordinariis armati. Pedes-maxillares graciles et longi, lutei, tibia tereti, subtus in parte apicali minutissime dentata; tarso tibia longiore, extus crasse marginato, supra ad basin apophysi nigra, parva, erecta et minutissime bifida armato; bulbo valde complicato.

Nov. Guinea : Dorey (A. Raffray).

Phaeacius ⁽¹⁾ **fimbriatus** sp. nov. — Long. 7 mill. — Cephalo-

(1) **Phaeacius** nov. gen. — A *Cocalo* imprimis differt stria thoracica longa, mamillarum superiorum articulo apicali basali multo minore et conico. — Typus *P. fimbriatus* E. Sim.

thorax fulvo-rufescens, parte cephalica antice et utrinque, prope oculos, late nigra, crasse et crebre albido-pubescentis. Pili oculorum et clypei longissimi, albi. Abdomen supra fulvo-testaceum, tenuiter reticulatum, late et confuse fusco-marginatum, subtus pallide luteum, omnino crebre albo-pubescentis. Chelae robustae, convexae, fusco-rufulae, crebre et longe albo-hirsutae, margine inferiore sulci dentibus quatuor, inter se acquidistantibus, 1^o et ultimo minutissimis, armato. Partes oris fuscae, late fulvo-marginatae. Sternum, pedes-maxillares pedesque lutea. Pedes longissime albo-hirsuti, valde et numerose nigro-aculeati, patellis, tibiis metatarsisque leviter fusco-variegatis. Plaga genitalis magna, rufula, latior quam longior, trapezoidalis, utrinque foveolata atque in medio septo angusto divisa.

Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

Linus albimanus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — A *L. fimbriato* Dolesch., cui affinis et subsimilis est, differt imprimis tibiis 1ⁱ paris fimbria inferiore longiore, nigro-cinerea non rufula, tibiis sex posticis haud fimbriatis, pedibus-maxillaribus maris nigricantibus, supra albo-pilosis (in *L. fimbriato* fulvis et fulvo-pilosis), apophysi tibiali longiore et divaricata, gracili sed obtusa.

India sept. : Dehra-Dun.

Codeta (1) **argenteo-limbata** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-piceus, utrinque fulvo-rufulo-pubescentis et vitta submarginali alba sat angusta, antice evanescente ornatus, parte cephalica squamulis pronis viridi violaceoque micantibus vestita. Pili oculorum supra fulvi, subtus albidi. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum, supra vitta nigricanti, squamulis micantibus vestita, antice latissima sed postice acuminata et utrinque vitta albo-argenteo-squamulata, postice sensim ampliata ornatum, subtus atrum, simpliciter albido-pubescentis. Sternum fuscum, parce albo-pilosum. Chelae sat longae, angustae, marginibus sulci duabus subcontiguas, superiore dentibus binis inter se remotis, dente 1^o obliquo, margine inferiore dentibus remotioribus trinis subcontiguas, 1^o majore armatis. Pedes fulvo-rufescentes, numerosissime aculeati. Pedes-maxillares sat breves, fusci, femore crasso, subtus compresso sed versus apicem sensim ampliato et processu obtuso, apice truncato et mucrone parvo serrato ornato, insigniter mu-

(1) **Codeta** nov. gen. — A *Lino* differt oculis ser. 2^{ae} minutissimis et pedibus haud fimbriatis, ab *Amyco* differt oculorum linea antica procurva (haud recurva) et pedibus 1ⁱ paris multo longioribus quam pedibus 3ⁱ paris. — Typus *C. argenteo-limbata* E. Sim.

nito, patella sat brevi, convexa supra ad apicem breviter acuminata; tibia patella brevior et angustior, subtus, ad angulum anteriorem, apophysi longa et acuta recta, secundum marginem tarsi oblique directa, apophysique media brevi sed crassa, apice truncata et minute bilobata, instructa; tarso sat late ovato, extus ad basin incisura obtusa alte marginata impresso; bulbo late ovato, apice emarginato, stylo brevi munito.

Singapore!

Amycus Pertyi sp. nov. — ♂ Long. 8,5 mill. — Cephalothorax altissimus (fere omnino depilis) laeterufescens, parte cephalica castanea, prope oculos nigra, clypeo nigro-aeneo, nudo, depresso, oculis magnis latiore. Abdomen angustum, postice acuminatum, nigricans, vitta longitudinali postice evanescente vittisque latis transversis trinis, testaceis et niveo-pilosis supra ornatum, subtus nigricans, utrinque testaceum. Mamillae nigricantes. Sternum fulvum. Partes oris castaneae, apice dilutiores, laminae longae et angustae, ad apicem divaricatae et extus dilatatae sed obtusae. Chelae longae, angustae et parallelae, oblique porrectae, ad basin nigro-aeneae, ad apicem sensim rufescentes, subtiliter coriaceae et transversim striolatae, in parte apicali extus tenuiter carinatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, obtuse dilatato, dein dentibus binis acutis, inter se remotis (1° altero duplo majore) armato, margine inferiore dentibus tribus subcontiguis, 1° reliquis majore, armato, ungue sat brevi, sed ad basin crassissimo, nec carinato nec dentato. Pedes longi, fulvo-rufescentes, femoribus sex anticis apice fusco nigrove annulatis, patella tibiaque 1ⁱ paris nigris, 2ⁱ et 3ⁱ paris infuscatis sed tibiis ad basin dilutioribus, metatarsis apice fuscis. Pedes-maxillares fulvo-ravidi; femore dilutiore, sat longo et leviter curvato, superne 1-1 aculeato; patella fere duplo longiore quam latiore, leviter ovata, subtus ad marginem anteriorem apophysi valida, subacuta et leviter arcuata, diametro articulo brevior, armata; tibia patella saltem 1/2 brevior, multo angustior et tereti, extus ad apicem apophysi nigra sat parva, depressa, lunata et acuta armata; tarso tibia cum patella circiter aequilongo, ad basin sat lato et extus, prope apophysem tibialem, scopulam setarum nigrarum gerente, versus apicem longe attenuato; bulbo disciformi, subrotundo, antice et extus stylo libero sat valido circumdato.

Peruvia : Rio Iça (Marañon sup.).

A. igneo Perty affinis.

A. ectypus sp. nov. — ♂ Long. 8,5-7 mill. — Cephalothorax altis-

simus, fusco-rufescens, subniger, prope oculos niger, parce aurantiaco-pubescentibus, parte thoracica utrinque atque in medio longius miniaceo-pilosa. Pili oculorum pauci, rufuli. Clypeus altissimus, nudus et glaber, in medio transversim subtiliter carinatus. Abdomen angustum, postice acuminatum, supra obscure testaceum et confuse biserialiter fusco-maculatum sed omnino crebre miniaceo-pubescentibus, linea marginali alba exili et sinuosa utrinque cinctum, subtus testaceum et parce albido-pilosum. Sternum obscure fulvum. Partes oris nigrae, laminae longae et angustae, apice divaricatae, extus dilatatae sed obtusae. Chelae longae, angustae et parallelae, plus minus proclives, nigro-nitidae, subtiliter coriaceae et transversim subtilissime striolatae, in parte apicali extus leviter carinatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, obtuse dilatato, dein dentibus binis acutis inter se remotis instructo, margine inferiore dentibus quatuor contiguis sat validis, sed basilari reliquis minore munito, ungue compresso, supra in medio carinato et minutissime dentato. Pedes longi, antici fusci, fere nigri, sed femore (apice excepto) metatarso tarsoque ad basin fulvis, reliqui pedes obscure lutei, femoribus ad apicem, patellisque saepissime leviter infuscatis. Pedes-maxillares fusco-olivacei; femore fulvo, sat longo et leviter curvato, superne 1-4 aculeato; patella circiter duplo longiore quam latiore, teretiuscula, subtus, ad marginem exteriorem, apophysi valida, compressa et subacuta, apice depressa et leviter divaricata, diametro articulo brevior, armata; tibia patella plus $\frac{1}{3}$ brevior, multo angustior, et tereti, extus apophysi apicali nigra, gracili, depressa et acuta, articulo non multo brevior, secundum tarsum directa, instructa; tarso ad basin sat lato et extus, prope apophysem tibialem, fasciculo setarum munito, sed apicem versus longe attenuato; bulbo disciformi subrotundo, antice et extus stylo libero valido circumdato.

Brasilia: Fonteboa, S. Paulo de Olivença (prov. Amazonas); Peruvia: Pebas, Yquitos (Marañon) (de Mathan).

A. rufifrons sp. nov. — ♂ Long. 7-8.5 mill. — *Amyco ectypo* affinis. Cephalothorax niger, parte cephalica et thoracica antice laete miniaceo-pubescentibus. Pili oculorum pauci, cinerei. Clypeus altissimus, aeneo-tinctus et pilis albis paucis ornatus, in medio transversim subtiliter carinatus. Abdomen nigrum, parce testaceo-punctatum et vitta media integra, postice attenuata, laete flavido-pilosa supra ornatum, subtus vitta media latissima nigra obtectum. Sternum fulvo-olivaceum, ad marginem leviter infuscatum. Chelae longae, angustae, plus minus proclives, nigro-cyaneo nitidae, evidenter transversim striatae, margine superiore sulci, prope unguem, haud dilatato, dentibus binis,

1° altero duplo majore, instructo, margine inferiore dentibus quatuor contiguus, basilari minore, munito. Partes oris nigrae. Pedes longi, fulvi, femoribus ad apicem, praesertim anticis, fusco-annulatis, patellis tibiisque eunctis fuscis (posticis dilutionibus), metatarsis tarsisque 1° paris apice late fuscis. Pedes-maxillares fuscis, femore fulvo, ut in praecedenti sed apophysi tibiali paulo minore, tarso paulo latiore et praesertim longiore.

Brasilia : le Para, Tefle (prov. Amazonas) ; Peruvia : Chamlireyacu (Paranapura) (de Mathan).

A. equulus sp. nov. — ♂ Long. 6,2 mill. — *Amyco ectypo* affinis. Cephalothorax niger, utrinque, prope oculos, parce rufulo-pilosus, et macula media longa pallide flavido-pilosa ornatus. Pili oculorum pauci, flavo-coccinei. Clypeus angustior, glaber. Chelae breviores, transversim distinctius striolatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, vix dilatato, dein dentibus binis remotis, 1° altero plus duplo majore, armato, ungue teretiussculo, haud carinato. Abdomen nigricans, antice arcu transverso albo-piloso, dein maculis mediis seriatis arcuatis et utrinque maculis majoribus binis obscure testaceis, anticis flavido, posticis albido-pubescentibus supra ornatum, subtus in medio cinereo- in lateribus albido-pilosum. Sternum fusco-olivaceum. Partes oris nigrae. Pedes antiqui nigricantes, metatarsis tarsisque ad basin fulvis, reliqui pedes castanei (postici dilutiones), femoribus obscure fuscis ad basin cum coxis anguste luteis, metatarsis tarsisque luteis. Pedes-maxillares fuscis, ut in *A. ectypo* sed apophysi patellari paulo graciliore, extus leviter arcuata, tibia brevior, tarso ad basin latiore.

Brasilia : le Para ; Peruvia : Yquitos (de Mathan).

A. annulatus sp. nov. — Long. 6,2-8 mill. — *Amyco equulo* affinis et subsimilis, differt parte thoracica macula media obscure rufa et flavido-pilosa notata, chelarum ungue supra in medio alte carinato, abdomine nigricanti, vitta media paulo dilutione secto, antice macula magna semi-circulari flavido-pilosa, dein maculis longis paucis niveo-pilosis quadriseriatis supra notato, sterno fuvo-olivaceo, pedum femoribus sex posticis ad basin fulvis, ad apicem subnigris, tibiis ad apicem anguste fuscis, pedibus-maxillaribus subsimilibus sed tarso ad basin latiore.

Brasilia : le Para, Tefle, São Paulo de Olivença (de Mathan).

A. flavicomis sp. nov. — ♂ Long. 6,3 mill. — *Amyco equulo* affinis. Cephalothorax niger, parte thoracica in medio dilutione et rufescenti.

cephalica macula latissima flavo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, nigro-cinerei. Clypeus glaber. Abdomen intense nigrum, vitta media integra, postice sensim attenuata, albo vel flavido-pilosa supra ornatum, subtus nigrum, parce albo-pilosum, utrinque dilutius et crebrius albo-pilosum. Sternum, partes oris chelaeque ut in *A. equulo*. Pedes lutei, femoribus ad apicem (praesertim anticis) anguste fuscis, patellis tibiisque 4ⁱ paris fusco-castaneis, reliquis leviter infuscatis. Pedes-maxillares fere ut in *A. equulo* sed apophysi patellari paulo longiore, paulo magis divaricata (superne visa) et ad basin leviter incrassata, apophysi tibiali paulo longiore et arcuata, tarso paulo angustiore.

Brasilia : le Para (de Mathan).

Maenola ⁽¹⁾ **Starkei** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax castaneus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica utrinque et antice coccineo-pilosa, parte thoracica macula media luteo-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus nudus, oculis mediis plus duplo angustior. Abdomen oblongum, fulvo-testaceum, supra fusco-punctatum et variegatum sed vitta media dilutiore lata et dentata, subtus vitta lata fusca, postice attenuata, notatum. Chelae latae, rufescentes, antice deplanatae et subtiliter coriaceae. Sternum pedesque lutea, femoribus anticis apice fusco-annulatis, patellis tibiisque anticis castaneis, tibiis metatarsisque posticis ad basin atque ad apicem minute fuscis. Pedes-maxillares breves et robusti, lutei, apice infuscati; patella vix longiore quam latiore; tibia multo brevior, latiore quam longiore, extus apophysibus binis : superiore angusta, longa, acuminata, apice intus uncatata, inferiore lata, depressa, apice leviter ampliata et recte secta, armata; tarso sat longe-oblongo; bulbo ovato ad basin convexo, stylo robusto intus marginato.

Venezuela : San Esteban!

Acragas ⁽²⁾ **longimanus** sp. nov. — ♂ Long 8,5 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica castanea maculis ocularibus nigris notata, antice pilis nigris longis et erectis munita, utrinque, prope oculos, miniaceo-pilosa et inter oculos macula magna

(1) **Maenola** nov. gen. — Ab *Amyco* differt clypeo oculis mediis plus duplo angustiore, tibiis anticis aculeis lateralibus interioribus plurimis armatis, pedum-maxillarium maris patella mutica. — Typus *M. Starkei* E. Sim.

(2) **Acragas** nov. gen. — Ab *Amyco* differt chelarum margine inferiore sulci dentibus 5, rarius 6, inter se distantibus armato, tibiis anticis aculeis lateralibus interioribus plurimis munitis, oculis parvis ser. 2^{ae} longe ante medium sitis. — Typus *A. longimanus* E. Sim.

obliqua niveo-pilosa ornata, parte thoracica glabra sed macula media parva triquetra niveo-pilosa notata. Pili oculorum pauci, miniacei. Clypeus altissimus, nigricans, macula media late ovata, niveo-pilosa decoratus. Abdomen angustum, obscure testaceum, parce fulvo-pilosum, postice maculis nigris sex biseriatis notatum, antice arcu transverso, postice linea media nodosa, inter maculas nigras ducta, et utrinque maculis binis arcuatis niveo-pilosis supra decoratum, subtus vitta media olivacea seu nigricanti munitum. Sternum luteum. Partes oris castaneae, laminae longae, extus ad apicem dilatatae sed obtusae. Chelae fuscae, violacco-tinctae, nitidae, longae, subparallelae et valde proclives, in parte apicali carina obliqua, apice (supra unguem) minute dentata atque ad marginem superiorem sulci dente nigro valido conico et acuto instructae, margine inferiore dentibus subaequalibus quinque armato, ungue valde curvato, supra incrassato, subtus valde compresso, utrinque sulcato. Pedes longi, pallide castanei, maculis niveo-pilosis supra ornati, femoribus, apice excepto, fulvis, tarsis luteis. Pedes-maxillares pallide flavidi, gracillimi et longissimi (cephalothorace multo longiores); patella femore haud brevior et tibia pedum anteriorum longior; tibia patella paulo brevior, tereti, extus apophysi apicali nigra, parva, sinuosa et acuta armata; tarso tibia multo brevior, angusto et tereti; bulbo parvo, breviter ovato, dimidium tarsum haud superante, intus ad apicem stylo brevi sat gracili et acuto munito.

Brasilia : Telfe (de Mathan).

A. leucaspis sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica coccineo-pilosa, ad marginem anticum vitta transversa longius nigro-pilosa, cristam formante, dein macula subquadrata laete niveo-pilosa ornata, parte thoracica glabra sed macula media parva niveo-pilosa ornata. Pili oculorum laete coccinei. Clypeus altissimus, sub oculis rufo-castaneus et macula vittiformi abbreviata niveo-pilosa ornatus, praeterea niger et glaber. Abdomen angustum, albido-testaceum, superne leviter fusco-reticulatum et postice maculis nigris quatuor, inter se subcontiguis notatum, antice vitta marginali arcuata, postice, inter maculas, vitta longitudinali niveo-pilosis decoratum, subtus omnino albo-testaceum. Sternum et partes oris luteae, laminae longae, extus ad apicem dilatatae et subangulosae. Chelae fulvo-rufescentes, nitidae, extus ad apicem minutissime carinatae, haud dentatae sed ad marginem superiorem sulci dente nigro, maximo, compresso et obtuso armatae, margine inferiore dentibus minutissimis sex, ultimis binis reliquis paulo majoribus armato, ungue supra in parte apicali lamelloso-carinato. Pedes longi,

fulvo-rufescentes, femoribus tarsisque luteis. Pedes-maxillares pallide flavi, fere praecedentis, tibia apophysi apicali nigra, recta et acuta, sed ad basin incrassata munita.

Venezuela : San Esteban !

A. procalvus sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — *Acraga longimanui* affinis. Cephalothoracis pars cephalica antice et in lateribus minus pilosa, maculis lateralibus niveis ornata sed crista nigra carens, clypei macula alba paulo angustiore, parallela atque ad marginem breviter acuminata. Abdomen subsimile sed subtus vitta obscuriore distinctiore. Sternum et partes oris luteo-nitida. Chelae fere ut in *A. longimanu* sed dente apicali carinae paulo majore et uncatō, dente marginis latiore et compresso, ungue crassiore, carina lamellosa, apice oblique secta et angulosa, supra munito. Pedes paulo breviores, castanei, antici posticis obscuriores, superne maculis albo-pilosis ornati, femoribus, apice excepto, tarsisque dilutioribus et fulvis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed apophysi tibiali ad basin paulo crassiore ad apicem leviter divaricata, stylo bulbi paulo crassiore sed acuto, extus angulatum inflexo.

Peruvia : Pebas (Marañon) (de Mathan).

A. castaneiceps sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica castanea, maculis ocularibus nigris latis notata, obscure rufulo-pubescenti, prope oculos et in medio parce niveo-pilosa et utrinque, pone oculos anticos, fasciculis nigris ornata, parte thoracica subglabra, latissime nigro-marginata. Pili oculorum mediorum rufuli, lateralium albi. Clypeus altissimus, niger, subglaber, sed in medio pilis rufulis paucis, vittam designantibus, ornatus. Abdomen angustum, supra nigricans, parce rufulo-pubescentis et vitta media integra fulva et flavido-pilosa ornatum, subtus testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Chelae longae, parallelae, nigro-violaceae, apice dilutiores, subtiliter transversim striolatae, dente apicali carinae vix ulla, dente marginali valida, compressa atque acuta, margine inferiore dentibus 4-5 aequis armato, ungue valido, supra, in medio, carina lamellosa humili munito. Sternum pedesque omnino fulvo-rufescentia. Partes oris nigrae. Pedes-maxillares lutei, tarso infuscato, apice tibiae albo-piloso; femore patellaque fere praecedentis; tibia patella fere duplo brevior, apophysi apicali nigra longior, valde depressa et acuta atque apophysi inferiore fulva, crassa et obtusa instructa; tarso tibia longior et latior, longe producto; bulbo subrotundo,

dimidium tarsum tantum occupante, stylo libero sat gracili fere omnino circumdato.

Brasilia : le Para (de Mathan).

A. phasianinus sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — *Acraga longimanui* affinis. Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica rufo-castanea et maculis ocularibus nigris notata, ad marginem anticum et prope oculos miniaceo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula obliqua atque macula media subrotunda niveo-pilosis decorata, parte thoracica glabra. Clypeus altissimus, nigricans, glaber. Abdomen testaceum, supra late nigricans, antice arcu transverso, prope medium punctis binis, postice vitta media et utrinque vittis obliquis abbreviatis niveo-pilosis decoratum, subtus testaceum, postice, prope mamillas, macula parva olivacea notatum. Sternum luteum, nitidum. Partes oris fulvo-rufulae. Chelae fere ut in *A. longimanu*, fusco-violaceae, subtiliter coriaceae, nitidae, dente apicali carinae paulo longiore, erecto et uncato, dente marginis valido, compresso et acuto, margine inferiore dentibus subaequis 4-5 armato, ungue crasso, supra, prope medium, valde compresso et lamelloso, apice oblique et sinuose secto. Pedes fusco-castanei, supra niveo-pilosi, femoribus, apice excepto, flavo-ravidis, tarsis luteis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed apophysi tibiali multo longiore, gracili, depressa et apice oblique truncata : bulbo ovato, dimidium tarsum vix attingente, stylo crasso, sinuoso et subanguloso, apice abrupte angustiore et extus inflexo munito.

Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

A. miniaceus sp. nov. — ♂ Long. 7,7 mill. — *A. longimanui* affinis. Pars cephalica obscure castanea, antice et prope oculos miniaceo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna pallide flavo-pilosa ornata, antice haud cristata, pars thoracica macula media flavida notata. Clypeus macula alba angusta, attenuata, marginem haud attingente ornatus. Abdomen fere *A. longimanus* sed obscurius, arcu transverso maculisque lateralibus flavidis munitum sed vitta postica carens, subtus fulvo-testaceum, haud vittatum. Sternum luteum. Partes oris fuscae. Chelae fere *A. longimanus* sed in parte apicali fortius coriaceae, dente apicali carinae minutissimo, vix ullo, sed dente marginali lato, valde compresso et leviter lanceolato, margine inferiore dentibus quinque, apicem versus sensim minoribus munito, ungue minus dilatato, compresso, haud sulcato, supra in parte basali leviter depresso et minutissime mucronato. Pedes paulo breviores et crassiores, fusco-castanei, maculis parvis niveo-pilosis supra ornati, femoribus in parte

basali tarsisque fulvis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed tibia paulo brevior, apophysi ad basin latiore et depressa, tarso paulo majore, nigricanti, bulbo majore, dimidium tarsum superante, stylo crasso et obtuso munito.

Var. — Pili cephalothoracis et macularum abdominis nivei, pedes pallidiores.

Brasilia : Rio Tocantins ; Peruvia : Tarapoto (Rio Mayo) (de Mathan).

A. erythraeus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — *A. longimanui* affinis. Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica castaneo-tincta, ad marginem anticum et prope oculos posticos coccineo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna flavo-pilosa et pone oculos anticos pilis nigris longis, erectis et fasciculatis ornata, parte thoracica macula media flavo-pilosa decorata. Pili oculorum pauci, miniaci. Clypeus fuscus, glaber. Abdomen fere praecedentis sed vitta media flavida supra notatum, subtus omnino testaceum. Sternum luteum. Partes oris infuscaetae. Chelae fere *A. miniacei*. Pedes fusco-olivacei, supra maculis niveo-pilosis decorati, postici anticis dilutiores, coxis, femoribus (apice excepto), metatarsis tarsisque pallide luteis. Pedes-maxillares fere praecedentis sed apophysi tibiali ad basin lata, apicem versus valde acuminata et acuta, bulbo ovato, dimidium tarsum superante, stylo sat crasso, tereti et obtuso munito.

Brasilia : Terra Nova prope Bahia (E. Gou nelle).

A. humilis sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — *A. longimanui* affinis. Cephalothorax humilior, parte cephalica ad marginem anticum et prope oculos dorsales aurantiaco-pilosa, utrinque, inter oculos, late niveo-maculata sed crista nigra carente. Clypeus paulo humilior, macula media niveo-pilosa, late ovata ornatus. Abdomen fere ut in *A. longimanu* sed supra obscurius, fere nigrum et vitta media nivea, antice ampliata ornatum, subtus luteum, sed postice vittis nigris binis abbreviatis ornatum. Sternum luteum. Partes oris infuscaetae. Chelae distinctius coriaceae, dente apicali vix ullo, dente marginali valido compresso, apice oblique truncato et leviter exciso, margine inferiore dentibus quinque sat validis et subcontiguis, versus apicem sensim minoribus armato, ungue minus dilatato, compresso, supra leviter carinato, in parte basali leviter depresso et minute mucronato. Pedes fusco-castanei, supra maculis niveo-pilosis ornati, postici dilutiores, femoribus, metatarsis (apice excepto) tarsisque luteis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed breviores, apophysi tibiali supra ad basin paulu-

lum dilatata dein gracillima et acuta, bulbo ovato, dimidium tarsum paulo superante, stylo crasso et obtuso munito.

Brasilia : Rio Salobro (E. Gounelle).

Hypaeus ⁽¹⁾ **tenuimanus** sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica infuscata, utrinque late nigra, pilis fulvo-coccineis, antice longioribus crebre vestita et utrinque, prope oculos posticos, macula niveo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, fulvi. Clypeus subglaber, oculis mediis latior. Abdomen supra fusco-aeneum, confuse nigro-plagiatum, antice maculis binis, dein macula media subtriquetra et postice maculis minoribus binis niveo-pilosis decoratum, subtus fusco-testaceum. Sternum luteum. Partes oris fuscae. Chelae longae, nigrae, sublaeves, antice, prope medium, dentibus binis subgeminatis, exteriore altero duplo majore insigniter instructis, margine inferiore sulci dentibus parvis trinis, ab apice longe remotis, sed inter se contiguis armato, ungue longo simplici sat gracili. Pedes longi, antici fusco-castanei, metatarsis tarsisque dilutioribus, reliqui pedes lutei, patella tibiaque ² paris leviter castaneis. Pedes-maxillares graciles et longi; femore longo, tereti, intus prope apicem minutissime tuberculato; patella plus quadruplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella vix brevior, angustior, extus ad apicem apophysi superiore fusca, brevi sed crassa, apophysique inferiore fere aequilonga sed gracillima instructa; tarso parvo, tibia vix longiore et vix latiore, tereti, teretiusculo; bulbo parvo, simplici, disciformi, dimidium tarsum haud superante.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. vividus sp. nov. — ♂ Long. 6-8 mill. — Cephalothorax nigellus parte thoracica antice dilutior et rufula, cephalica, praesertim antice fulvo-ravido-pubescenti, utrinque macula obliqua et postice, inter oculos, macula media acute triquetra pallide flavido-pilosis ornata. Pili oculorum pauci, fulvo-rufuli. Clypeus glaber, oculis magnis paulo angustior. Abdomen angustum, supra fusco-aeneum, parce fulvo-pilosum, antice punctis binis, dein lineis marginalibus abbreviatis albo-pilosis ornatum, subtus fusco-testaceum, vitta nigro-cyanea notatum. Chelae sat longae et divaricatae, nigro-nitidae, subtiliter et parce striatae, margine superiore sulci dentibus quatuor, inferiore dentibus

(1) **Hypaeus** nov. gen. — Ab *Amyco* differt chelarum margine superiore dentibus seriatis 4, 5 vel 6 subcontiguis, angulari (3^o vel 4^o) reliquis paulo majore armato. — Typus *H. porcatus* Taczan.

tribus subaequis, inter se remotis armatis, ungue simplici, tereti. Sternum et partes oris fusco-olivaceae. Pedes longi, antici nigri vel fuscii, metatarsis tarsisque dilutioribus, interdum fulvis, reliqui pedes lutei, apice femorum patellisque vix infuscatis. Pedes-maxillares fuscii, sat graciles; patella tereti, plus triplo longiore quam latiore; tibia patella saltem $1/4$ brevior, angustior et tereti, extus ad apicem leviter dilatata et apophysibus binis nigris brevibus armata; superiore depressa, antice directa et breviter lanceolata, inferiore minore, conica et divaricata; tarso medioeri, tibia cum patella paulo brevior, ad basin paulo latiore; bulbo disciformi, subrotundo, apice leviter depresso, intus stylo valido marginato.

Brasilia : Tefé, S. Paulo de Olivença; Peruvia : Pebas, Yquitos (de Mathan).

H. triplagiatus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax pallide fusco-castaneus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica parce coccinco-pilosa, utrinque, inter oculos, macula obliqua, et postice, fere inter oculos posticos, macula laete flavo-pilosis ornata. Clypeus glaber, oculis magnis circiter $1/3$ angustior. Abdomen supra nigrum, vitta media integra et utrinque vitta marginali angustior et sinuosa testaceis et flavo-pilosis ornatum, subtus obscure testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Sternum olivaceum. Partes oris nigricantes. Chelae fusco-nitidae, aeneo-tinctae, laeves et nitidae, vix distincte striatae, haud carinatae, margine superiore sulci dentibus quatuor, 3^o reliquis majore, inferiore dentibus trinis aequis armatis. Pedes lutei, femoribus, patellis tibiisque $1/2$ paris, praesertim in lateribus valde infuscatis. Pedes-maxillares fulvi; patella saltem duplo longiore quam latiore, subtereti; tibia patella fere $1/3$ brevior, paulo angustior, tereti-uscula, extus apophysii apicali nigra, brevi et bifida (ramulo superiore crasso, depresso, antice directo et apice truncato cum angulo superiore breviter et acute producto, ramulo inferiore divaricato atque acuto); tarso patella cum tibia brevior, sat late ovato, intus crasse piloso; bulbo disciformi, subrotundo, stylo apicali valido sed acuto munito.

Brasilia : Rio Tocantins, Fonteboa; Peruvia : Cavallo Cocho (de Mathan).

H. venezuelanus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, regione oculari utrinque nigra, parte cephalica fulvo-aurantiaco-pilosa et utrinque antice, pone oculos, pilis longioribus erectis nigro-sericis, aream obliquam occupantibus ornata, parte

thoracica vitta media luteo-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus nudus, oculis mediis latior. Abdomen supra nigrum, vitta lata valde flexuoso-dentata, testaceo-albida omnino marginatum et maculis parvis obliquis quatuor luteo-pilosis, aream quadratam designantibus ornatum, subtus vitta lata nigra, testaceo-marginata notatum. Mamillae superiores nigrae, inferiores olivaceae. Chelae longae, nigricantes, transversim subtiliter striatae sed area apicali rufula nitida, intus tenuiter carinata, extus dente mediocri acuta et uncata armata, notata, margine superiore sulci dentibus quatuor (2° et 3° majoribus), margine inferiore dentibus parvis aequis 5 vel 6 armatis, ungue robusto, supra, prope medium, leviter dilatato. Sternum fusco-rufulum. Pedes antici fusco-castanei, femoribus nigris, metatarsis tarsisque luteis. Pedes quatuor postici omnino lutei. Pedes-maxillares longissimi et gracillimi, corpore toto haud breviores, albo-testacei; femore ad basin plus minus infuscato; patella tenui, longissima (femore non brevior): tibia tenui, patella brevior, apice leviter incrassata, extus ad angulum inferiorem apophysi recta, depressa, obtusa et longissime crinita, ad angulum superiorem apophysi longiore gracili, leviter curvata apice minute uncata munita; tarso angusto et tereti, multo brevior sed bulbum ovatum multo superante.

Venezuela : San Esteban! Valencia!

H. estebanensis sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — A praecedenti, cui valde affinis et subsimilis est, differt abdomine supra fulvo, vitta marginali maculisque quatuor obliquis flavido-pilosis supra ornato, subtus omnino testaceo, haud vittato, chelarum maris calcare subapicali longiore, graciliore et valde uncato.

Venezuela : San Esteban!

H. quadrinotatus sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, pilis laete coccineis, versus medium sensim flavido-tinctis, ad marginem anticum longioribus et cristam formantibus crebre vestita. Pili oculorum pauci, coccinei, sub oculis mediis nigri. Clypeus oculis mediis circiter $1/4$ angustior, subglaber, setis fulvis paucis conspersus. Abdomen fulvo-testaceum, punctis fuscis biseriatis sex notatum, antice flavo-nitido-pilosum, utrinque maculis obliquis niveo-pilosis ornatum, subtus luteum. Sternum et partes oris lutea. Chelae breves, fuscae, coriaceae, extus nec carinatae nec dentatae, sed intus ad basin tuberculo obtuso munitae, margine superiore sulci sat profunde emarginato dein dilatato et dentibus subaequalibus 7 munito, margine inferiore

dentibus minoribus aequis et contiguis 3 armato, ungue prope medium carina lamellosa, alte lobata munito. Pedes lutei, femoribus (quatuor anticis fere usque ad basin, reliquis tantum ad apicem) infuscatis, subnigris seu olivaceis. Pedes-maxillares lutei, tarso infuscato; patella plus duplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella fere $\frac{1}{3}$ brevior, angustior, apophysi apicali nigra, gracili et acuta, sat longa, antice directa et leviter curvata armata; tarso patella cum tibia haud brevior, latiore, attenuato et leviter curvato; bulbo disciformi, stylo libero fere omnino marginato.

Brasilia : Teffe, Fonteboa (de Mathan).

H. porcatus Taczanowski, *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1872 (*Attus*). — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica utrinque, inter oculos, albo-pilosa, ad marginem frontalem setis longis et erectis nigro-sericeis, cristam (in medio quam ad laterales paulo brevior) formantibus ornata, parte thoracica antice paulo dilutior et macula albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, albidi. Clypeus glaber, oculis anticis non multo angustior. Abdomen angustum, testaceum, supra, praesertim postice, fusco-variatur, maculis biseriatis 4-4, anticis parvis reliquis majoribus et longis, et utrinque serie macularum minorum niveo-pilosis decoratum, subtus luteum. Sternum fulvo-olivaceum. Chelae parum longae, latae, antice deplanatae, apice paululum depressae et extus apophysi marginali maxima, obtusa et oblique truncata armatae, margine inferiore sulci dentibus quatuor (1 et 2 reliquis majoribus) instructo, ungue simplici. Pedes 1ⁱ paris fere nigri, femore ad basin metatarsoque ad apicem fulvis, patella superne tibiaque ad basin albo-pilosis, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem patellis tibiisque ad basin atque ad apicem leviter infuscatis. Pedes-maxillares medioeres, flavi, tarso infuscato; femore gracili et curvato; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia patella multo brevior, apophysi superiore nigra, acuta, valde hamata et supra sulcata apophysique inferiore maxima, depressa, truncata et subquadrata extus armata; tarso medioeri, subparallelo; bulbo simplici, disciformi, stylo libero, intus marginato.

Cayenne.

H. flavipes sp. nov. — ♂ Long. 6,7 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica vix dilutior, cephalica utrinque pilis coccineis, in medio pilis obscure olivaceis, ad marginem frontalem pilis nigro-sericeis longissimis, cristam magnam erectam designantibus vestita. Pili oculorum pauci, cinerei, secundum oculos laterales coccinei. Clypeus

glaber, oculis magnis haud angustior. Abdomen angustum, testaceum, flavo-nitido-pubescent, vitta fusco-castanea, postice sensim attenuata, vittaque ventrali lata sed vix expressa notatum. Sternum et partes oris castanea. Chelae fuscae vel nigrae, coriaceae, leviter striatae, prope apicem longitudinaliter impressae, atque ad marginem exteriorem, paulo pone medium, dente parvo et obtuso munitae, margine superiore sulci dentibus quinque, 4^o majore, inferiore dentibus parvis subaequis quatuor armatis, ungue ad basin crasso et cylindrato, dein elevato et acute bicarinato. Pedes flavi, coxis et apice tibiaram 4ⁱ paris infuscatis. Pedes-maxillares flavi, tarso leviter infuscato; femore robusto, fusiformi, versus basin attenuato; patella femore angustiore, terti. plus duplo longiore quam latiore; tibia patella brevior, versus basin angustiore, extus ad apicem truncata, ad angulum superiorem apophysi gracili, simplici et acuta, ad angulum inferiorem leviter producta et subacuta; tarso parvo et angusto, tibia cum patella brevior; bulbo nigro, simplici et disciformi.

Brasilia : le Para, Cameta (de Mathan).

H. miles sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Ab *H. flavipedi* valde affinis. Cephalothorax subsimilis, sed parte thoracica macula media dilutiore, albo-pilosa ornata et crista frontali nigra, longa et erecta munita. Abdomen supra pallide fusco-testaceum, vitta media dilutiore, parce fulvo-pubescenti et maculis parvis biseriatis albo-pilosis ornatum, subtus testaceum, vitta media latissima nigra notatum. Sternum fulvo-olivaceum. Partes oris obscure fuscae, fere nigrae. Chelae nigro-cyaneae, versus apicem dilutiores et rufescentes, extus in parte apicali validissime dilatatae et turbinato-productae, margine inferiore sulci dentibus validis contiguis tribus armato, ungue simplici, haud carinato. Pedes lutei, apice femoris, patella tibiaque 4ⁱ paris nigro-castaneis sed tibia inferne et in medio paulo dilutiore, pilis albis annulati. Pedes-maxillares lutei, fere ut in *H. flavipedi*, sed tibia extus ad apicem haud calcarata, leviter dilatata et carina obtusa nigra simpliciter munita.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (prov. Amazonas) (de Mathan).

H. annulifer sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — *H. flavipedi* affinis. Crista frontalis cinereo-nigra, longa et erecta, postice pilis brevioribus fulvis mixta, partis cephalicae macula lateralis interocularis et partis thoracicae macula media pallidissime flavo-pilosae. Pili oculorum pauci, flavidi. Clypeus oculis mediis haud vel non multo angustior, ad marginem pilis albis longis munitus. Abdomen pallide testaceum, supra infuscatum et vittis binis dilutioribus notatum, antice arcu transverso

dein lineis binis parallelis pallide flavo-pilosis decoratum, subtus concolor. Chelae fere ut in *H. flavipedi*, sed fusco-rufulae, dente exteriori paulo validiore et subacuto, margine inferiore sulci dentibus validioribus quatuor contiguis munito, ungue simplici, haud elevato, vix distincte carinato. Sternum luteum. Pedes longiores lutei, femore, patella, basi apiceque tibiae 4^a paris valde infuscatis, interdum subnigris. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, femore patellaque ut in *H. flavipedi*; tibia brevior, intus ad apicem producta, extus apophysi superiore fusca, parva, obtusa et valde uncata, apophysique inferiore multo majore, antice oblique directa, apicem versus leviter incrassata, rotunda vel obtuse truncata armata; bulbo stylo validiore sed acuto munito.

Brasilia : Fonteboa (de Mathan).

H. ignicomis sp. nov. — ♂ Long 7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica obscuriore et prope oculos nigra, crista frontali longa, lata et erecta, laete coccinea, utrinque inter oculos macula lata et postice macula media parva albo-pilosis ornata, parte thoracica macula media majore alba notata. Pili oculorum coccinei. Clypeus subglaber, oculis mediis latior. Abdomen angustum, fusco-testaceum, maculis magnis albo flavidove pilosis biseriatis 3-3 supra ornatum, subtus vitta media obscuriore parum expressa notatum. Sternum fulvo-rufescens. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufulae, apice dilutiores, sublaeves, in parte apicali late impressae et dente exteriori magno lato, obtuso et leviter uncato instructae, margine superiore sulci dentibus 4 vel 5, 3^o angulari reliquis majore, margine inferiore dentibus 4 aequis armatis, ungue simplici, leviter carinato. Pedes longi, lutei, femoribus ad apicem, patellis cunctis, tibiis ad basin atque ad apicem (praesertim anticis) late fusco-annulatis. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tibia tarsoque castaneis, fere ut in *H. flavipedi* sed tibia longiore, apophysi superiore majore, crassa, depressa, apice rotunda, apophysi inferiore obtusissima et lobiformi.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. frontosus sp. nov. — ♂ Long. 6.5 mill. — *H. ignicomi* valde affinis. Cephalothoracis pars cephalica antice rubro-cristata, sed macula frontali-media albido-pilosa ornata, utrinque, inter oculos, aurantiaco (haud albo) pilosa et macula media triquetra flavida notata, macula media thoracica flavido-pilosa. Pili oculorum pallide flavi. Clypeus paulo angustior. Chelarum dens exterior brevior, valde depressus, obtuse triquetar, margo inferior dentibus contiguis trinis. 1^o majore, tantum armatus. Pedes, praesertim postici, minus distincte annulati. Pedes

maxillares fere ut in *H. ignicomi* sed fere omnino lutei, apophysi tibiali superiore minore, recta et subacuta, inferiore fere obsoleta.

Brasilia : Le Para, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. luridomaculatus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — *H. ignicomi* affinis. Pars cephalica crista frontali obscure fulvo-coccinea, maculis lateralibus maculaque media postica albido-flavidis ornata. Pili oculorum supra et in medio coccinei, extus et subtus albi. Abdomen, chelae pedesque ut in *H. ignicomi*. Pedes-maxillares subsimiles sed tibia patella evidentius brevior, haud infuscata, apophysi tibiali superiore nigra, ad basin lata sed acute triquetra, inferiore fere obsoleta.

Brasilia : Fonteboa (de Mathan).

H. furcifer sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, crista frontali coccinea longa ornata, utrinque parce flavido-pilosa et postice, prope oculos, pilis coccineis ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus oculis mediis paulo angustior, infuscatus, ad marginem pilis longis paucis albis munitus. Abdomen angustum, fulvum, maculis fuscis maculisque niveo-pilosis arcuatis biseriatis (3-3) supra ornatum, subtus concolor. Sternum luteum. Partes oris castaneae, apice dilutiores. Chelae longae, subparallelae, muticae, haud carinatae, subtiliter coriaceae, margine superiore sulci dentibus minutissimis 7 vel 8 (6° angulari, reliquis majore), inferiore dentibus 5 vel 6, inter se subcontiguis et radicem unguis fere attingentibus armatis, ungue simplici, haud carinato. Pedes sat longi, lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque quatuor anticis, metatarsis tarsisque 4ⁱ paris fusco-castaneis. Pedes-maxillares lutei, tarso fusco; femore sat longo, tereti, ad basin leviter attenuato; patella tereti, plus triplo longiore quam latiore; tibia patella plus 4/3 brevior et ad basin angustior, supra ad apicem obtuse prominula, extus apophysi apicali nigra, ad basin convexa, ad apicem truncata et minute bifida instructa; tarso medioeri, attenuato, tibia cum patella brevior; bulbo late ovato, disciformi, intus stylo robusto sed acuto, ad apicem lamina nigra depressa, obtusa et curvata munito.

Brasilia : le Para (de Mathan).

H. concinnus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — Ab *H. furcifero*, cui valde affinis est, differt parte cephalica crista frontali ex pilis longis coccineis flavisque mixtis, et utrinque, inter oculos, macula magna flavescenti-pilosa ornata, clypeo angustiore, in medio, sub oculis, macula vel vitta lata, longe et crebre niveo-pilosa decorato. — Chelae

subsimiles, sed margine inferiore sulci, dentibus trinis, 1^o minore tantum armato. Pedes-maxillares subsimiles, sed apophysi tibiali apice simpliciter truncata cum angulo superiore minute dentato; bulbo stylo validiore, depresso sed acuto munito.

Brasilia : Teffe (de Mathan).

H. nigrocomosus sp. nov. — ♂ Long. 6,7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica leviter obscuriore et prope oculos nigra, antice fulvo, utrinque, inter oculos, flavido-pubescenti et pone marginem frontalem pilis erectis nigro-sericeis, aream transversim ovatam occupantibus ornata. Pili oculorum fulvi, inter oculos medios albi. Clypeus oculis anticis non multo angustior, utrinque glaber, in medio longe et creberrime niveo-pilosus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, punctis nigris sex biseriatis maculisque parvis niveo-pilosis et utrinque maculis binis (2^a minore) albis decoratum, subtus vitta latissima obscuriore notatum. Sternum luteum. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufulae, nitidae, apice sublaeves, ad basin subtiliter striolatae, extus prope medium paululum convexae, margine superiore sulci dentibus 3, medio paulo majore, inferiore dentibus trinis, 1^o subapicali, obtuso, reliquis binis validioribus, acutis et subgeminatis, armatis, ungue simplici, apice compresso. Pedes longi, antici fusco-castanei, femoribus ad basin, metatarsis tarsisque fulvis, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque plus minus castaneo-tinctis. Pedes-maxillares lutei, apice infuscati; patella haud duplo longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, apophysibus longis binis extus armata, apophysi superiore angulum occupante, longa et recta sed apice leviter uncat, inferiore valde arcuata, gracili sed depressa et leviter lamellosa; tarso sat longo, leviter curvato, intus crasse piloso; bulbo brevi, apice obtuse truncato et subquadrato, stylo obliquo, simplici, gracili et longo intus atque ad apicem marginato.

Brasilia : Teffe (de Mathan).

H. cucullatus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, versus marginem sensim infuscatus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica utrinque late albo-pilosa antice, supra oculos, vitta transversa longe et crebre nigro-pilosa ornata, parte thoracica macula media magna, subtriquetra, albo-pilosa ornata, clypeo, saltem in medio, longe et crebre albo-barbato. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, supra antice vitta transversa, dein maculis seriatis trinis et utrinque vittis obliquis arcuatis binis niveis ornatum, mamillis saltem inferioribus olivaceis. Sternum luteum. Chelae fere praecedentes.

tis, sed margine superiore sulci dentibus trinis, medio paulo majore armato, ungue supra obtuse tuberculato. Pedes longi et robusti, lutei, femoribus ad apicem anguste fusco-annulatis, patellis tibiisque, praesertim in lateribus, valde infuscatis. Pedes-maxillares lutei; patella haud duplo longiore quam latiore; tibia patella saltem duplo brevior, extus ad apicem apophysi lata, apice truncata, cum angulo inferiore obtuso, superiore longe producto, gracili, apice subacuto et valde uncatu armata; tarso sat lato; bulbo disciformi, rubro, stylo longissimo, circulos binos formante circumdato.

Ecuador merid. : Loja (Gaujon).

Noegus ⁽¹⁾ **transversalis** sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica obscuriore, prope oculos nigra, pilis coccineis, antice longioribus et cristam formantibus, crebre vestita, utrinque, inter oculos, macula lata pallide flavo-pilosa, ornata, parte thoracica subglabra, area media flavido-pilosa ornata. Pili oculorum supra coccinei, infra oculos pallide flavi. Clypeus depressus, oculis mediis circiter $\frac{1}{3}$ angustior, utrinque glaber, in medio creberrime pallide flavo-pilosus. Abdomen angustum, luteo-testaceum, supra maculis albis sex biserialis ornatum, subtus leviter infuscatum. Sternum fulvum, nitidum. Chelae mediocres, parallelae, fusco-violaceae, in parte apicali dente exteriori acuto munitae. Pedes longi, lutei, quatuor antici obscuriores et rufescentes, femoribus tibiisque utrinque late fusco-vittatis, femoribus posticis apice fusco-annulatis, patellis tibiisque utrinque plus minus fusco-lineatis. Pedes-maxillares lutei; femore gracili; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore; tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ brevior et paulo crassior, supra apice leviter prominula et minute bifida; ramulo superiore brevissimo et obtuso, ramulo exteriori longiore, divaricato atque obtuso; tarso tibia cum patella longiore, sat late ovato, leviter curvato et longe attenuato; bulbo magno, disciformi, stylo spirali omnino circumdato.

Brasilia : le Para, Cameta (Rio Tocantins), Tefe (de Mathan).

N. fulvocristatus sp. nov. — ♂ Long. 5,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica nigra, ad marginem frontalem vitta transversa lata, longe fulvo-pilosa et utrinque, prope oculos posticos, macula parva lunata, niveo-pilosa ornata, parte thoracica versus marginem sensim obscuriore sed macula media albo-pilosa ornata. Pili

(1) **Noegus** nov. gen. — Ab *Hypaeo* differt chelarum margine superiore dente angulari sat valido, remoto, tantum armato. — Typus *N. vulpio* E. Sim.

oculorum supra aurantiaci, infra oculos flavidi. Clypeus depressus, nigricans, parce albo-pilosus. oculis magnis saltem 1.3 angustior. Abdomen angustum, luteo-testaceum, antice infuscatum, antice vittis duabus abbreviatis, postice punctis binis niveo-pilosis supra ornatum, subtus vitta media obscuriore vix expressa notatum. Sternum olivaceum. Partes oris fuscae. Chelae longae, nigrae, subtiliter rugosae et parce rugatae, extus, pone medium, dente parvo et acuto armatae, margine superiore sulci dentibus binis, 1^o majore, inferiore dentibus quatuor contiguis, 1^o et 2^o paulo majoribus instructis, ungue simplici, haud carinato. Pedes lutei, antici, metatarsis tarsisque exceptis, fusco-olivacei. Pedes-maxillares obscure fulvi, ad basin dilutiores; femore longo et gracili; patella plus triplo longiore quam latiore, versus basin leviter attenuata; tibia patella saltem 1.3 brevior, ad basin angustiore, supra ad apicem obtuse prominula et extus apophysi brevi, gracili, valde curvata et apice oblique truncata armata; tarso angusto, longo, longe producto; bulbo breviter ovato, subrotundo, dimidium tarsum haud superante, stylo libero gracillimo munito.

Brasilia : le Para.

N. rufus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *N. transversali* affinis. Cephalothoracis pars cephalica ad marginem anticum longe coccineo-cristata, praeterea laete flavo-aurantiaco pubescens, pars thoracica subglabra, pilis flavidis paucis conspersa. Clypeus in medio, usque ad marginem, crebre flavido-pilosus. Abdomen luteo-testaceum, antice maculis subcontiguis atris supra notatum. Pedes quatuor antici fusco-castanei, tarsis 1ⁱ paris, metatarsis, tarsis basique femorum 2ⁱ paris dilutioribus et luteis, pedes postici lutei, femoribus ad apicem vix infuscatis. Pedes-maxillares graciles, obscure fulvi; patella teretiusecula, plus quadruplo longiore quam latiore; tibia patella fere duplo brevior, apice obtuse truncata atque ad angulum exteriorem apophysi divaricata, brevi, gracili sed obtusa instructa; tarso tibia cum patella vix brevior, tereti, angusto et leviter curvato; bulbo breviter ovato vel obtuse cordiformi, dimidium tarsum haud superante, intus stylo brevi marginato.

Brasilia : Rio Tocantins; Peruvia : Rio Ica.

N. niveomarginatus sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — A *N. transversali*, cui valde affinis et subsimilis est, differt parte thoracica versus marginem infuscata, parte cephalica utrinque niveo (haud flavido) pilosa, clypeo latiore et linea transversa angusta, albo-barbata ornato, chelis paulo longioribus, dente exteriore minore armatis, tibia pedum-

maxillarium supra ad apicem late truncata atque ad angulum anteriorem apophysi longa, gracillima et styliformi, antice directa munita.

Brasilia : Cameta (Rio Tocantins).

N. coccineus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — A *N. nireomarginato*, cui affinis est, differt cephalothorace latiore, parte cephalica antice et in lateribus, usque ad oculos posticos, coccineo-pubescenti, in medio (?) parce flavido-pilosa, clypeo subglabro, pilis longis, albis, paucis tantum consperso, abdomine supra fusco, maculis anticis duabus utrinque subcontiguis et vittam formantibus notato, chelis latioribus, dente exteriori validiore et in parte basali sito munitis, pedibus luteis, anticis, tarso excepto, fusco-rufulis. Pedes-maxillares longi et tenues, fusco-rufuli, apice dilutiores; femore gracili; patella plus quadruplo longiore quam latiore, tereti sed versus basin leviter attenuata; tibia patella circiter $\frac{1}{3}$ brevior, sed multo longiore quam latiore, versus basin angustiore, supra apice obtuse truncata atque, ad angulum anteriorem, apophysi parva, gracili et infra directa munita; tarso gracillimo, tereti, tibia cum patella brevior et vix latior; bulbo dimidium tarsum haud vel vix superante, sat anguste ovato, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Fonteboa (Amazonas).

N. fuscimanus sp. nov. — ♂ Long. 6,2 mill. — A *N. transversali*, cui valde affinis est, differt parte cephalica maculis lateralibus latis vittaque media, marginem frontalem attingente, niveo-pilosis decorata, pedibus obscurioribus, annulis niveo-pilosis ornatis, pedibus-maxillaribus multo longioribus et gracilioribus; tibia longiore, versus basin attenuata, apophysi gracili acuta et antice directa extus armata; tarso multo minore et angustiore; bulbo longe ovato, intus stylo brevior marginato.

Brasilia : le Para, Teffe.

N. comatulus sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — *N. transversali* affinis. Pars cephalica coccineo-pilosa, utrinque macula interoculari et in medio vitta longitudinali, frontem haud attingente, pallide flavo-pilosis ornata, pars thoracica late fusco-marginata et macula media, subtriquetra, flavido-pilosa notata. Clypeus in medio crebre flavido-pilosus. Abdomen luteo-testaceum, antice maculis quatuor transversim seriatis, postice maculis similibus binis flavo-pilosis decoratum. Chelae sublaeves, nigricantes, nitidae, apice leviter dilutiores, dente exteriori valido, acuto et paulo ante medium sito armatae. Pedes 4ⁱ paris fusco-castanei.

femoribus utrinque late nigris, tarsis luteis, reliqui pedes pallide-lutei. Pedes-maxillares pallide fusco-castanei; patella saltem triplo longiore quam latiore; tibia apice obtuse truncata, et extus apophysi sat brevi, antice oblique directa, gracili sed obtusa munita; tarso tibia cum patella haud longiore, saepius brevior, angusto et subtereti, longe producto; bulbo breviter ovato vel rotundo, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Terra Nova prope Bahia (E. Gounelle).

N. actinosus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *N. transversali* affinis, cephalothoracis pars cephalica pilis coccineis, antice longis et supra oculos pilis flavidis mixtis vestita, utrinque inter oculos macula magna pallide flava notata sed oculis posticiis anguste coccineo-cinctis, pars thoracica ad marginem infuscata et macula media, subrotunda, pallide flavo-pilosa ornata. Clypeus in medio, usque ad marginem, creberrime flavido-barbatus. Abdomen luteo-testaceum, supra leviter infuscatum, macula anteriore parva et utrinque maculis binis, 1^a longa et curvata, altera subrotunda, niveo-pilosis decoratum, mamillis infuscatis. Chelae nigro-nitidae, coriaceae, apicem versus leviter ampliatae, transversim carinulatae, abrupte depressae et laeviores, extus calcare longo, cylindrato, acuto et valde incurvo armatae. Pedes quatuor antici fusco-brunnei, metatarsis tarsisque paulo dilutioribus, femoribus 2ⁱ paris ad basin luteis, pedes quatuor postici lutei, femoribus ad apicem confuse fusco-annulatis. Pedes-maxillares mediocres, lutei, femore ad basin, tibia tarsoque infuscatis; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore, intus leviter depressa; tibia patella fere duplo brevior, apice obtuse truncata, angulo exteriori breviter et acute producto; tarso tibia cum patella paulo longiore, sat angusto et longe producto; bulbo breviter ovato et obliquo, stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : S. Paulo de Olivença; Peruvia : Cavallo-Cocho.

N. vulpio sp. nov. — ♂ Long. 5,4-4,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica prope oculos nigra, aurantiaco-pilosa, utrinque inter oculos late pallide flava et vitta media, postice ampliata, flavido-pilosa ornata, parte thoracica infuscata, subglabra, in medio parce albido-pilosa. Pili oculorum coccinei. Clypeus nigricans, glaber, depressus, oculis magnis saltem $\frac{1}{3}$ angustior. Abdomen luteum, supra saepe olivaceum, lineis binis parallelis et postice maculis parvis binis niveo-pilosis ornatum, subtus vitta media, olivacea, rarius nigricanti notatum. Partes oris fuscae. Chelae nigrae, apice rufescentes, extus, vix pone medium, dente parvo et acuto armatae. Pedes 1ⁱ paris fusco-

castanei, femore subnigro, tarso luteo, tibia saepe luteo-annulata, reliqui pedes omnino lutei. Pedes-maxillares fusco-ravidi; patella circiter triplo longiore quam latiore (interdum brevior); tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ brevior, supra ad apicem obtuse acuminata, extus apophysi styli-formi sat longa oblique directa munita; tarso tibia cum patella multo brevior, angusto, teretiusculo et longe producto; bulbo breviter ovato seu subrotundo, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Rio, Tijuca prope Rio; Terra Nova prope Bahia; Matushinos (prov. Minas) (E. Gouelle).

N. niveogularis sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, aurantiaco flavoque pubescenti et utrinque albo-maculata, parte thoracica vitta marginali et postice vitta abbreviata, subtriquetra pallide fuscis et maculis oblique divaricatis laete niveo-pilosis ornata. Pili oculorum laete coccinei. Clypeus oculos medios vix aequans, sub oculis glaber, ad marginem vitta lata, crebre niveo-pilosa ornatus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, lineis binis fuscis notatum, antice arcu transverso, dein utrinque maculis obliquis, biserialis, niveo-pilosis ornatum, subtus vitta nigra notatum. Sternum luteum. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufescentes, coriaceae, haud striatae, extus, prope basin, calcare longissimo, tereti et acuto, antice directo, apice intus leviter curvato, et prope apicem dente parvo, nigro, insigniter armatae, margine superiore dentibus minutissimis binis denteque paulo majore angulari, inferiore dentibus parvis quinque, ultimis binis paulo majoribus armatis. Pedes robusti, quatuor anteriores pallide castanei, metatarsis tarsisque luteis, femoribus utrinque nigricanti-vittatis, pedes postici omnino lutei. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tibia tarsoque leviter rufescentibus, bulbo nigro; patella vix duplo longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, multo angustior, apophysi subbasilari longa et divaricata, apice obtusa, apophysique apicali nigra et minuta armata; tarso tibia cum patella paulo longiore; bulbo maximo, disciformi, stylo crasso spirali bicircumdato.

Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gouelle).

N. bidens sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris, posticis valde ampliatis notata, aurantiaco-pubescenti, parte thoracica tenuiter nigro-marginata, pilis niveis conspersa. Pili oculorum flavidi. Clypeus oculos medios vix aequans, sub oculis glaber, praeterea crasse albo-pilosus. Abdomen angustum, supra fulvo-testaceum, prope medium maculis

fuscis binis notatum, maculis lineisque niveo-pilosis decoratum, subtus vitta lata nigra notatum. Sternum luteum. Partes oris chelaeque fusco-rufescentes. Chelae subtiliter coriaceae, haud striatae, antice, prope basin, dentibus binis transversim dispositis, depressis et apice uncatis, inferiore altero saltem duplo majore armatae, marginibus sulci fere praecedentis sed inferiore dentibus trinis aequis tantum munito. Pedes longi, sat robusti, quatuor antici pallide castanei, metatarsis tarsisque luteis, femoribus utrinque late nigricanti-vittatis, tibiis annulo medio lato luteo notatis, metatarsis ad basin atque ad apicem anguste rufulo-annulatis. Pedes postici lutei. Pedes-maxillares fere praecedentis sed apophysi tibiali apice truncata, leviter ampliata et malleiformi.

Brasilia : Tijuca prope Rio ; Minas : Matushinos, Caraca (E. Gou-nelle).

N. arator sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, pilis coccineis, ad marginem frontalem longioribus et cristam latam formantibus vestita, utrinque, inter oculos, late luteo-pilosa et postice macula parva lutea notata, parte thoracica fere glabra. Pili oculorum flavo-aurantiaci. Clypeus depressus, oculis magnis vix $\frac{1}{3}$ angustior, in medio crebre luteo-pilosus. Abdomen angustum, luteum, supra leviter infuscatum et maculis albo-pilosis decoratum. Sternum fulvo-rufescens. Partes oris infuscae. Chelae fulvo-rufescentes, nitidae, antice deplanatae, versus apicem sensim ampliatae atque extus calcare subapicali magno, robusto sed acuto et valde uncatu armatae, margine superiore sulci longo, dentibus remotissimis binis, 1° angulari majore, margine inferiore dentibus subaequis et acutis quinque armatis, ungue longo, simplici. Pedes fusco-rufescentes, femoribus, saltem ad basin, late dilutioribus, annulis albo-pilosis ornati. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, apice infuscati; femore longo; patella fere triplo longiore quam latiore, versus basin leviter attenuata; tibia patella plus duplo brevior et paulo latiore, intus longe crinita, extus breviter producta et conica; tarso tibia cum patella multo longiore, apice longe producto et teretiusculo; bulbo medium tarsum tantum occupante, sat parvo, disciformi, sed stylo longissimo, circulos tres formante marginato.

Brasilia : Manaos (Hau x well).

N. uncatu sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — *N. aratori* affinis. Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica nigra, ad marginem anticum pilis coccineis longis et erectis, cristam latam formantibus ornata, et utrinque, inter oculos, luteo-pilosa, parte thoracica fere gla-

bra. Pili oculorum flavo-aurantiaci. Clypeus glaber, leviter depressus, oculis magnis vix $1/4$ angustior. Abdomen angustum, luteum, maculis longis sex biseriatis pallide luteo-pilosis supra ornatum. Sternum fulvum. Partes oris fuscae. Chelae longae, parallelae, nigricantes, transversim rugatae, apice dilutiores, laeviores et depressae, extus in parte apicali calcare longo sed gracili et incurvo armatae, margine superiore sulci longo, dentibus remotissimis binis, 1^o angulari majore, margine inferiore dentibus contiguus sex, 1^o et 2^o reliquis paulo majoribus instructis. Pedes antici fusco-rufuli, metatarsis tarsisque dilutioribus, quatuor postici lutei. Pedes-maxillares fulvi; patella tereti, saltem triplo longiore quam latiore; tibia patella paulo brevior, ad basin paulo angustiore, ad apicem sensim ampliata, intus longe crinita, extus leviter angulosa; tarso longo, angusto, teretiunculo; bulbo parvo, basin tarsi tantum occupante, breviter ovato, intus stylo gracillimo munito.

Brasilia : Sao Paulo de Olivenca (de Mathan).

Mago acutidens sp. nov. — ♂ Long 7 mill. — Cephalothorax crassus et brevis, fusco-rufescens, parte cephalica prope oculos nigra, macula frontali parva et utrinque macula magna niveo-pilosis ornata, parte thoracica in medio dilutiore et macula niveo-pilosa, antice, inter oculos, paululum producta notata. Pili oculorum pauci, rufuli, inter oculos medios albi. Clypeus oculis anticis fere duplo angustior, parce et longe albo-pilosus. Abdomen fusco-testaceum, vitta media lata lutea notatum, parce et longe luteo-pilosum, antice arcu transverso, dein maculis parvis seriatis niveo-pilosis supra ornatum, subtus vitta media lata fusca notatum. Sternum luteum. Partes oris nigrae. Chelae sat breves et latae, nigrae, leviter aeneo-tinctae, coriaceae et transversim striolatae, extus, pone medium, dente conico armatae, margine superiore sulci minute dentato atque ad angulum dentibus majoribus (praesertim medio), margine inferiore dentibus quinque, 1^o et ultimo minoribus instructis, ungue simplici. Pedes robusti, antici fusco-castanei, subnigri, metatarsis tarsisque vix dilutioribus, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque cunctis pallide castaneis. Pedes-maxillares fusci, albo-pilosi, interdum pallide flavi; patella circiter $1/3$ longiore quam latiore, subtereti; tibia patella duplo brevior, ad basin paulo angustiore, extus apophysi apicali nigra, crassa et striolata, apice obtusa, supra ad basin breviter et acute dentata; tarso mediocri, tibia cum patella circiter aequilongo, paulo latiore; bulbo breviter ovato, stylo libero, sat longo, gracili et subrecto intus munito.

Brasilia : le Para, Cameta (Rio Tocantins), Tefte vel Ega.

M. longidens sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — A *M. acutidenti*, cui affinis est, differt chelis magis coriaceis, dente exteriore longiore, gracili sed apice obtusa et infra directa instructis, pedibus-maxillaribus obscurioribus, albo-pilosis, apophysi tibiali obtusiore, supra lobo obtusissimo, antice truncato munita. Caetera ut in *M. acutidenti*.

Brasilia : Teffe vel Ega (de Mathan).

M. vicanus sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica obscuriore et prope oculos nigra, parce miniaceo-pubescenti, utrinque, inter oculos, macula magna flavo-pilosa ornata, parte thoracica subglabra sed macula media longa, flavido-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus subglaber, oculis anticis saltem $\frac{1}{3}$ angustior. Abdomen fusco-testaceum, vitta media lata binodosa notatum, supra parce et longe fulvo-pilosum et maculis parvis brevius niveo-pilosis ornatum, subtus vitta media lata nigricanti notatum. Sternum obscure fulvum. Partes oris nigrae. Chelae robustae, sat longae et subparallelae, nigro-opaceae, crebre coriaceae et transversim rugatae, margine superiore sulci dentibus parvis 5 vel 6, inferiore dentibus 5, paulo majoribus et inter se contiguis armatis. Pedes sat longi, antici nigricantes, femoribus cyaneo-tinctis, patellis metatarsis tarsisque ad basin, tibiis in medio leviter rufescentibus et albo-pilosis, reliqui pedes obscure fulvi, femoribus ad apicem patellis tibiisque cunctis obscure olivaceis, parce albo-pilosis. Pedes-maxillares subnigri, patella dilutior; patella plus duplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella brevior, leviter incrassata, extus ad apicem truncata atque apophysibus brevibus binis, superiore crassa, obtusa et subrotunda, inferiore acute turbinata instructa; tarso angusto, subparallelo, tibia cum patella brevior; bulbo sat longe ovato, apicem versus longe attenuato et stylo brevi, recto, valido sed acuto munito.

Brasilia : Rio Tocantins, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

M. pexus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *M. vicano* affinis. Cephalothorax angustior, macula frontali, macula media thoracica et utrinque macula interoculari albo-pilosis ornatus. Pili oculorum coccinei, sed supra oculos medios albi. Clypeus glaber, oculis magnis fere duplo angustior. Chelae fere ut in *M. vicano* sed laeviores et nitidiores, extus in parte media carinula mutica, rarius minute dentata munitae, margine superiore sulci dentibus binis, 1° majore et bifido, margine inferiore serie dentium 6-7, versus apicem sensim minorum instructis, ungue supra, prope medium, acute dentato. Abdomen pedesque fere *M. vicani*. Pedes-maxillares fusco-castanei; patella plus duplo

longiore quam latiore, tereti; tibia patella non multo brevior sed, praesertim ad basin, angustior, extus ad apicem abrupte depressa, recte secta et subacuta, cum angulo superiore acute producto et erecto; tarso angusto, attenuato, tibia cum patella paulo brevior; bulbo anguste ovato, apice sensim attenuato et stylo brevi, gracili et simplici munito.

Brasilia : Fonteboa, S. Paulo de Olivença; Peruvia : Yquitos (Maranon), Chamlireyacu (Paranepura).

M. opiparis sp. nov. — ♂ Long 7,6 mill. — *M. pexo* affinis. Cephalothorax crassior, parte cephalica coccineo-pilosa, utrinque macula lata, macula frontali, maculisque mediis binis parvis, parte thoracica macula media, ovata, pallide flavo-pilosis notatis. Pili oculorum coccinei. Abdomen fuscum, supra testaceo-punctatum et vitta media lata, flexuosa, testacea ornatum, subtus vitta latissima nigricanti notatum. Sternum obscure fulvum. Chelae fere ut in *M. vicano*, margine superiore sulci dentibus quatuor, 3^o majore, inferiore dentibus subaequis et contiguis quatuor armatis, ungue simplici, haud dentato. Pedes praecedentis. Pedes-maxillares castanei, breviores et robustiores; patella vix $\frac{1}{3}$ longior quam latior; tibia brevior et paulo latior, apophysibus binis, superiore nigra, lamellosa, apice truncata cum angulis, praesertim superiore, acute productis, inferiore fulva, longior, obliqua et subacuta extus ad apicem instructa; tarso latior; bulbo breviter ovato, stylo nigro, in parte basali crasso, compresso et contorto, in parte apicali gracillimo, recto atque obliquo.

Brasilia : le Para.

M. saperda sp. nov. — ♂ Long. 8,5 mill. — *M. vicano* affinis. Cephalothoracis pars cephalica parce aurantiaco-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, flavidi. Abdomen obscure testaceum, lineis binis parallelis fuscis atque antice arcu transverso albo-piloso supra ornatum, subtus luteum, concolor. Chelae fere *M. vicani* sed laeviores et nitidiores, extus leviter carinatae, margine superiore dentibus parvis quinque, 4^o reliquis duplo majore, inferiore dentibus contiguis 5. 1^o reliquis minore armatis. Pedes antici castanei, reliqui lutei, femoribus metatarsisque ad apicem, patellis tibiisque cunctis pallide castaneis. Pedes-maxillares obscure fulvi, albo-pilosi; patella circiter duplo longior quam latior, teretiuscula; tibia patella circiter $\frac{1}{3}$ brevior, haud angustior, tereti, extus ad apicem recte truncata cum angulo inferiore breviter producto;

tarso tibia cum patella circiter longitudine aequo, paulo latiore; bulbo breviter ovato, stylo libero, sat longo et gracili intus munito.

Brasilia : le Para, Teffe, Fonteboa.

M. procax sp. nov. — ♂ Long. 8-10 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica castanea, utrinque prope oculos nigra et albo-pilosa, parte thoracica macula media albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, supra flavidi, subtus albidi. Clypeus oculis mediis saltem duplo angustior, pilis longis albis paucis munitus. Abdomen fusco-testaceum, antice arcu transverso, in medio maculis longis quatuor biseriatis et utrinque maculis trinis arcuatis niveo-pilosis supra ornatum, subtus testaceum, postice paululum infuscatum. Sternum fulvum. Partes oris castaneae. Chelae crassae, paululum divaricatae, fusco-aeneae, nitidae, rugatae, extus obtuse carinatae, margine superiore sulci dentibus sex, quatuor anticis parvis, 5^o angulari, valido, ultimo mediocri, inferiore dentibus quatuor subcontiguis instructis, ungue valido, compresso, supra, prope basin, minute et obtuse tuberculato. Pedes robusti, quatuor antichi fusco-castanei, femore tarsoque 2ⁱ paris luteis. pedes postici lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque plus minus castaneo-tinctis. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tarso infuscato; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore; tibia patella fere $\frac{1}{3}$ brevior, tereti, apophysī sat longa, gracili et acuta, antice recte directā, extus ad apicem armata; tarso parvo, tibia cum patella multo brevior; bulbo breviter disciformi, ad basin sat convexo, stylo gracili intus marginato.

Peruvia : Tarapoto (Rio Mayo).

Encolpius (1) **albobarbatus** sp. nov. — ♂ Long. 4,2 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, subtiliter coriaceus, parte cephalica antice rufulo praeterea fulvo-pubescenti, thoracica ad marginem albo-pilosa. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus oculis mediis plus $\frac{1}{3}$ angustior, vitta crasse niveo-pilosa marginatus. Abdomen supra nigellum, obscure testaceo-variā, parce fulvo-pubescenti, supra mamillas fasciculo parvo setarum albarum ornatum, subtus atro-testaceum. Mamillae fuscae, superiores nigrae. Sternum olivaceum. Partes oris nigrae. Chelae nigrae, nitidae, apicem versus sensim ampliatae et

(1) **Encolpius** nov. gen. — A *Mayone* differt oculis parvis ser. 2^o longe ante medium sitis, oculis quatuor anticis in lineam valde recurvam, clypeo sub oculis glabro ad marginem vitta crebre barbata ornato. — Typus *E. albobarbatus* E. Sim.

abrupte truncatae, cum angulo superiore calcare valido acuto et uncatō instructo, margine superiore dentibus trinis, medio paulo majore, inferiore dentibus 4-5 subaequis et contiguīs armatis, ungue simplici, supra acute carinato. Pedes fuscī vel olivacei, metatarsis, tarsis cunctis femoribusque posticis ad basin late luteo-annulatis. Pedes maxillares lutei, ad basin atque ad apicem infuscāti, pilis albis longissimis et divaricatis insigniter plumosi; patella tereti, saltem triplo longiore quam latiore; tibia patella vix $\frac{1}{4}$ brevior, apophysi superiore parva, nigra et conica, apophysique exteriorē longissima, articulo vix brevior, arcuata, gracili et oblique divaricata armata; tarso tibia cum patella haud brevior, ad basin latior, sed valde attenuato; bulbo simplici, disciformi, stylo gracillimo, apice libero circumdato.

Brasilia : le Para.

Amphidraus (1) **auriga** sp. nov. — ♂ long. 3 mill. — Cephalothoracis pars cephalica nigra, pilis rufulis incurvis vestita, ad marginem frontalem pilis longioribus, erectis, albido-luteis cristata, pars thoracica glabra, fulvo-rufula, subtiliter reticulata et tenuiter nigro-cincta. Pili oculorum albido-lutei. Clypeus parce albo-pilosus, et setis longioribus binis erectis in medio munitus. Abdomen breve, supra luteum et albo-pubescent, in parte basali utrinque late et flexuose nigricanti-marginatum, utrinque prope medium macula magna transversa, postice arcubus parvis duobus nigricantibus supra ornatum. Chelae fulvo-rufulae. Pars labialis fusca. Laminae, sternum pedesque lutea, metatarso 2^o paris ad apicem tarsoque ad basin nigricantibus. Pedes maxillares lutei, femore patellaque crasse albo-hirsutis; femore brevi, curvato, subtus leviter et obtuse emarginato; tibia patella saltem aequilonga, supra ad basin apophysi nigra, longa, gracili et flagelliformi, antice recurva, subtus apophysi submedia gracili, paulo brevior, subrecta, sed apice minute uncatā armata; tarso bulboque magnis; bulbo simplici, ad basin anguloso.

Bolivia : Espiritu-Santo (Garlepp).

A. nigritarsis sp. nov. — ♂ Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica obscure rufo-pubescenti, in medio et utrinque, prope

(1) **Amphidraus** nov. gen. — Ab *Amyco* et *Magone* differt oculis parvis ser. 2^o paulo pone medium sitis, ab oculis posticis spatio oculo (postico) non latiore distantibus, quadrangulo oculorum dorsalium postice quam antice multo angustiore, clypeo reclinato, oculis mediis plus duplo angustiore, pedibus anticis brevibus. — Typus *A. auriga* E. Sim.

oculos, albido-pilosa, thoracica fere glabra. Pili oculorum rufuli. Clypeus subglaber. Abdomen breviter ovatum, nigrum, albo-pilosum, supra vitta latissima et dentata dilutiore, antice vittam angustiorem lanceolatam, postice lineas transversas nigricantes includente, supra notatum, subtus atrum, utrinque paulo dilutius, parce albo-pilosum. Chelae fuscae. Sternum et partes oris nigro-nitida, laminae ad marginem dilutiores. Pedes obscure fulvi, valde nigricanti-annulati, tarsis 4ⁱ paris nigerrimis. Pedes-maxillares breves et robusti, lutei, crasse et longe albo-hirsuti, tarso rufulo, apice nigro et nigro-piloso: femore compresso, leviter curvato; patella crassa et convexa; tibia patella multo brevior, latior quam longior, fere annuliformi, apophysi exteriori apicali medioeri et acuta armata; tarso longo, depressiusculo et longe attenuato; bulbo magno, simplici.

Venezuela : Fracatal (Caroni) (L. de Bertier).

Letoia ⁽¹⁾ **ephippiata** sp. nov. — ♀ Long. 3, 5 mill. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, niger, opacus, fere glaber, parte cephalica, prope oculos, pilis rufulis paucis munita et utrinque in declivitate longe albo-pilosa. Pili oculorum rufuli. Pili clypei albi, longissimi, in medio erecti, in lateribus decumbantes. Abdomen breve, antice obtuse et late truncatum, flavo-nitido-pubescent, in parte basali pallide testaceum sed antice in declivitate nigro-marginatum, in parte altera nigricans et macula maxima, ovato-transversa, ephippiformi ornatum, subtus antice testaceum, postice sensim infuscatum, regione epigasteris rufula et nitida. Chelae fusco-castaneae, glabrae et nitidae. Sternum et partes oris fusco-castanea, parte labiali apice membranacea et albida. Pedes lutei, femoribus 4ⁱ paris metatarsisque quatuor posticis ad apicem leviter infuscatis et olivaceis.

Venezuela : San Esteban!

(1) **Letoia** nov. gen. — Ab *Amyco* et *Magone* differt oculis anticis (antice visis) inter se contiguis, apicibus lineam leviter procurvam (non recurvam) designantibus, clypeo angusto, crebre barbato, pedibus anticis brevibus. — Typus *L. ephippata* E. Sim.

